

Faculté de Médecine de Paris

Année 1953.

N°

T H E S E

485

pour le

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

BERGE, Claude

Né le 20 Juin 1926 à Casablanca (MAROC)

Présentée et soutenue publiquement le

PARODONTOPATHIES PRECOCES.

— oOo —

Président : M. DECHAUME, Professeur.

— oOo —

Faculté de Médecine de Paris

Année 1953.

T^o

T H E S E
pour le
DOCTORAT EN MEDECINE
(Diplôme d'Etat)

par

BERGE, Claude

Né le 20 Juin 1926 à Casablanca (MAROC)

Présentée et soutenue publiquement le

PARODONTOPATHIES PRECOCES.

- oOo -

Président : M. DECHAUME, Professeur.

- oOo -

DOYEN HONORAIRE :

M. BAUDOUIN

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BAUDOUIN, BRINDEAU, CARNOT, CHEVASSU, CHIRAY, CLERC, DELBET, GOUGEROT (H.), GUILLAIN, HARVIER, LAIGNEL-LAVASTINE, LAUBRY, LEMAITRE, LEMIERRE, LHERMITTE, LOEPER, MARION, MATHIEU, MOCQUOT, MULON, OMBREDANNE, ROUVIERE, SANNIE, SEBILEAU, SEZARY, TANON.

DOYEN : Léon BINET,
Membre de l'Institut.

ASSEESSEUR : Jean VERNE.

I. - PROFESSEURS

MM.

Anatomie	CORDIER (G.)	
Anatomie pathologique	DELARUE (A.)	
Bactériologie	GASTINEL (P.)	
Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)	
Biologie médicale	VERNE (J.)	
Cancérologie médicale et sociale	HUGUENIN (R.)	
Carcinologie	OBERLING (C.)	
Chimie médicale	POLONOVSKI (M.)	
	(Hôtel-Dieu	BROCQ (P.)
	(Saint-Antoine	CADENAT (F.)
Cliniques chirurgicales	(Salpêtrière	MONDOR (H.)
	(Cochin	QUENU (J.)
Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique	MERLE D'AUBIGNE	
Clinique de cardiologie	DONZELOT (E.)	
Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie	FEVRE (M.)	
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire	MONOD (R.)	
Clinique de la tuberculose	BERNARD (E.)	
Clinique de neuro-chirurgie	PETIT-DUTAILLIS	
Clinique de puériculture	LELONG (M.)	
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	DEGOS (R.)	
Clinique des maladies du sang	CHEVALLIER (P.)	
Clinique des maladies du système nerveux	ALAJOUANINE (T.)	
Clinique des maladies des enfants	DEBRE (R.)	
Clinique des maladies infectieuses	MOLLARET (P.)	
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale	DELAY (J.)	
Clinique gynécologique	FUNCK-BRENTANO	
	(Hôtel-Dieu	BENARD (H.)
	(Fichat	LAROCHE (G.)
Cliniques médicales	(Cochin	MOREAU (R.)
	(Pitié	LIAN (C.)
Clinique médicale d'hydro-climatologie théra- peutique	JUSTIN-BESANCON (J.)	

Biologie médicale	(BOURLIERE (P.) ETTORI (J.) Pr.s.ch.
Chimie médicale	(JAYLE (M.F.) pr.s.ch. SCHAPIRA (G.)
Dermato-Syphiligraphie	(N... BULLIARD (H.) Pr.s.ch.
Histologie	(COUJARD (R.) DESCLAUX (P.) DEBRAY (C.)
Hydrologie	(BOYER (J.) DEPARIS (M.)
Hygiène	(DEROBERT (L.) GAULTIER (J.)
Médecine légale	(N... SEZE (S. de) GRASSET (J.) LEPAGE (F.) MAYER (M.)
Neurochirurgie	(MERGER (R.) RAVINA (J.) VARANGOT (J.) OFFRET (G.)
Neurologie	(DESVIGNES (P.) HALPHEN (E.) pr.s.ch.
Obstétrique	(MADURO (R.) BRUMPT (L.) CHABAUD
Ophthlalmologie	(ABOULKER (P.) BAUMANN (J.) GOSSET (J.) HUGUIER (J.) LAURENCE (G.) LEGER (L.) OLIVIER (Cl.) PADOVANI (P.) POILLEUX (M.) ROUX (E.) RUDLER (J.-C.) VERNE (J.-M.)
Oto-rhino-larygologie	(MERKLEN (P.) BERNARD (J.) BOUDIN (G.)
Parasitologie	(GASTAIGNE (P.) CONTE (M.) DECOURT (J.)
Parasitologie coloniale	
Pathologie chirurgicale	
Pathologie expérimentale	
Pathologie médicale	



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40153720_0021

	{ BOULIN (R.)
	{ BROUET (G.)
	{ CACHERA (R.)
	{ GARCIN (J.)
Clinique Médicale	{ HAGUENEAU (M.)
	{ LENE GRE (J.)
	{ MARCHAL (G.)
	{ SOULIE (E.)
Clinique obstétricale	{ DIGONNET (L.)
	{ EGALLE (G.)
Clinique ophtalmologique	REHARD (G.)
Clinique Urologique	COUVELLAIRE (R.)

Secrétaire de la Faculté : MOREL (J.)
 Secrétaire-adjoint : Mlle CHAINTREUIL (P.)

Bibliothécaire en Chef Docteur HAHN (A.)
 Bibliothécaires (M. DOUAN (G.), Mlles DUMAIRE (P.)
 GOICHON (A.-M.), LE NOIR (G.)

Par délibération en date du 9 Décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

I N T R O D U C T I O N

La description des maladies du parodontite nécessite une terminologie précise qui doit être basée sur la connaissance exacte de l'anatomie et de l'histologie du parodontite normal.

La dent est un organe complexe. Les tissus qui constituent la dent forment un système fonctionnel "l'organe dentaire" ou odonton. L'ensemble des organes dentaires forme la denture.

TELLIER, WESKI, JACCARD, HULIN et A.J. HESLO ont bien souligné les deux constituants de l'organe dentaire.

- a) d'une part, la dent proprement dite formée par l'émail, la dentine et la pulpe dérivant d'un bourgeon dentaire primitif épithélio-conjonctif.
- b) d'autre part, les éléments de la gencive (ROY) ou muque gingivo-dentaire (TELLIER) qui forme le parodontite.

Ce parodontite est un complexe épithélio - conjonctif (TELLIER) qui comprend le ciment, le périodonte ou ligament alvéolo-dentaire, l'os alvéolaire, la fibre muqueuse gingivale. Cette conception séparant l'étude du ciment de celle des tissus dentaires proprement dite, se justifie par des considérations anatomiques embryologiques et physiologiques.

tités marginales surviennent à la suite d'une infection de l'os général ou bien l'évolution est plus sévère et plus rapide que chez l'adulte, des gingivites hypertrophiques, avec une réaction intense locale en particulier, des parodontites ou périodontites alvéolaires, très rares sur la dentition temporaire.

- Dans la période pubertaire, l'auteur signale des gingivites généralisées, des "parodontites marginales" avec résorption importante de l'os alvéolaire, pouvant aller jusqu'à l'expulsion des dents; l'atrophie pré-sénile ou atrophie sénile précoce, siégeant au niveau des dents antérieures et des premières molaires en haut, sans signe inflammatoire, dont l'étiologie est à peu près inconnue, et dont l'image histo-pathologique est semblable à celle de l'atrophie sénile physiologique; enfin, des "périodontoses" apparaissant avec la puberté dont l'étiologie est obscure, mais dans laquelle les facteurs constitutionnels jouent un grand rôle.

H. MERITT (1950) distingue : des gingivites marginales hypertrophiques, hyperplasiques, ulcéreuses, et des gingivites avec desquamation chronique; et d'une part, de la pyorrhée alvéolaire ou "périodontite", dans laquelle l'os alvéolaire et la gencive sont détruits avec formation de culs-de-sac pyorrhéiques, et d'autre part, de la "périodontose", qu'il définit comme étant une atrophie diffuse du "périodonte" (parodonte) avec déplacement des dents. Cette dernière ne s'observe à l'état pur que chez l'enfant et surtout chez les jeunes filles de 17 à 19 ans atteintes de diabète, néphrite, tuberculose, déficience de nutrition. Le pronostic de cette affection est grave.

CHILTON (1950) montre l'intérêt de l'examen radiographique précoce de l'os alvéolaire et de la "lamina dura" dans le dépistage systématique des parodontopathies. L'auteur émet aussi l'opinion suivant laquelle c'est chez l'enfant que l'on peut établir le tableau clinique de la "périodontose", une "périodontose" à évolution des os d'atrophie précoce. De plus, CHILTON cite une statistique de BLACK (1918) selon laquelle sur 600 personnes prises au hasard, 13 % d'entre elles entre 20 et 24 ans étaient atteintes de parodontite. L'auteur cite aussi BLACK (1918) qui donne les chiffres suivants : 22 % de 11 à 20 ans et 31 % de 21 à 25 ans, le critère étant la résorption osseuse.

LEBOURG et DESCROZAILLES (1946) étudient une parodontite profonde à la puberté se développant sous l'influence d'un régime riche en hydrates de carbone.

M. DECHAULE, Mme A. CHAPUT et A.-J. HELD (1949) décrivent une parodontite précoce de l'os alvéolaire au premier stade histiocytaire-odontogène de la parodontite de la région de l'incisive SCHULLER CHRISTIAN.

B. SEIDLER et S.C. MILLER (1950) étudient 36 cas de destruction précoce de l'os alvéolaire et en tirent les conclusions suivantes :

- la maladie frappe plus de jeunes filles que de garçons.

- elle siège dans la région antérieure et au niveau des premières molaires.

- "L'alvéoclasie" est plus diffuse chez les garçons.

- Le maximum de gravité survient à 13 ans, âge de la puberté chez les jeunes filles, et un peu plus tard, chez les adolescents.

- Enfin, chez 80 % des malades dont le régime était trop riche en hydrates de carbone, la restriction de ceux-ci a apporté une nette amélioration.

JACOWSKI (1951) sur des sujets âgés de 19 à 23 ans, observe au Tonkin, des parodontoses inflammatoires coexistant avec un régime mal équilibré, des colites parasitaires avec leurs complications buccales, et l'habitude de chiquer le bétel.

J.L. SCALES (1952) remarque qu'au cours des stomatites communes de l'enfance, les surfaces les plus susceptibles sont les frontières des différentes sortes de muqueuses.

R. BATAILLE et B. DUPERRAT (1952) étudient les parodontolyses au cours de certains kératodermies palmo-plantaire.

Mme A. CHAPUT, P. UHRY et COLL (1952) à propos de l'observation de 62 enfants atteints, décrivent les lésions du parodonte chez ces sujets.

WICKMAN (1952) étudie les lésions périodontales chez l'enfant. Il distingue :

- les gingivites localisées de cause locale,
- les gingivites généralisées d'étiologie générale,
- les parodontites superficielles des incisives et des premières molaires,
- et les parodontites profondes qui sont très rares

SHAPIRA (1952) classe les signes de début des maladies du parodonte : mobilité des dents, saignement au brossage, changement de forme du collet dentaire, formation de pus, dat carvies, (sang au brossage), inflammation locale, saignement sang, enfin modification radiographique.

BOUYSSOU (1953) a observé une véritable pyorrhée alvéolaire des dents temporaires existant à la suite d'un traitement par la thyroxine chez une jeune fille âgée de 17 ans, qui présentait, par ailleurs une anhydrie, une hypertrichose et alignement de 19 dents permanentes, avec qu'une lésion chronique, syphilis, anémie.

En dépit du grand nombre de ces références, le sujet des lésions fait l'objet d'une revue d'ensemble dans un examen systématique.

Nous commencerons donc par l'étude des parodontopathies précoces chez les enfants, puis celle des parodontopathies chez les adolescents et les adultes jeunes avant 25 ans.

a) Gingivites de cause locale chez l'enfant.

Les gingivites de cause locale sont souvent prédominantes au voisinage d'un point d'irritation.

Les causes locales des gingivites chez l'enfant sont l'éruption dentaire, les dépôts de tartre, les caries non soignées, les troubles de l'occlusion, la respiration nasale.

- Accidents de dentition - Une gingivite localisée érythémateuse ou ulcéreuse survient parfois le soir au moment d'une éruption temporaire mortifiée plus ou moins vasculaire ou d'un abcès radiculaire. Parfois, l'éruption d'une dent permanente entraîne une péri-coronarite. L'évolution de cette gingivite est bénigne ou rigide et s'accompagne le plus souvent d'une adénite dans le territoire ganglionnaire correspondant.

- Dépôts tartriques - Le tartre sus-ou sous-gingival existe fréquemment chez les enfants, il est cependant pas exceptionnel chez l'enfant bien portant. Ainsi, BRUCKER (1942) a pu établir une statistique sur les enfants du Nov-Foundland (Golfe du St.-Laurent). Les résultats sont les suivants :

- à 5 ans, 5 enfants sur 100 ont un dépôt tartrique important
- à 14 ans, 20 enfants sur 100 " " " " "

- Caries - BRUCKER M. (1943) sur un groupe de 72 garçons et 47 filles présentant des gingivites légères trouvait 2,5 à 3,5 caries par enfant et pour 12 garçons et 11 filles ayant des gingivites sévères, relève 4 à 5 caries par enfant. Pour ALLEN S.D. (1947) l'antagonisme entre caries et gingivite de parodontite n'est pas absolu, et la gingivite de parodontite prédominante, favorisée par des caries non traitées, est une variété clinique non négligeable. BRUCKER (1943) sur 100 enfants du Nov-Foundland, trouve, à 5 ans, 38 % de caries et à 14 ans, 30 %

- Occlusions déséquilibrées. - La surcharge de certaines dents, les traumatismes fonctionnels, les malocclusions dentaires, les mauvaises habitudes (sujeter du pouce, interposition de la langue) l'absence de fonction, sont également nocifs et déterminent fréquemment des gingivites localisées érythémateuses et quelquefois ulcéreuses.

- Respiration buccale. - La respiration buccale entraîne une lésion gingivale de type hyperplasique, qui est favorisée par la présence d'un courant d'air froid inspiré. L'irritation produite par le courant d'air froid inspiré.

L'aspect de toutes ces gingivites de cause locale est variable. Elles sont érythémateuses, ulcéreuses, hyperplasiques; elles prédominent le plus souvent au voisinage du point d'irritation causale. La pathogénie est complexe, toujours multifactorielle, les gingivites sont poly-microbiennes. On a même pu mettre en évidence un groupe de germes. Cependant la participation d'un facteur neuro-végétatif surajouté est indéniable et toujours important. (ROUSSEAU-DECELLE et M. DECHAUME).

2) Gingivites de cause générale ou systémique.

Les gingivites où la cause générale prédomine sont plus nombreuses encore que les gingivites de cause locale et leur évolution en est plus grave ainsi que leur pronostic.

Nous distinguerons les gingivites génotypiques spécifiques de l'enfant, médicamenteuses, les gingivites chez le diabétique, chez l'hyperthyroïdien, dans les hémopathies, et les gingivites de la nutrition.

- Gingivites hyperplasiques génotypiques. - Signalée par KONJETZNY (1927), elle a été observée chez des familles successives comprenant 39 sujets dont 20 hommes et 19 femmes. Parmi eux, 9 femmes et 7 hommes présentaient l'affection qui est donc du type dominant. KONJETZNY l'aurait observée chez deux jumeaux. Mme A. CHAPUT l'a observée chez une jeune fille dont le père en était atteint.

L'hyperplasie peut s'observer lors de la première dentition et à 12 ans elle est notable et se développe aux dépens de la fibromuqueuse gingivale du côté lingual et vestibulaire. Il existe souvent un retard de l'éruption de certaines dents. L'hyperplasie est ferme, diffuse, lobulée, non inflammatoire. La coexistence d'hypertrichose (K.H. THOMA, L.T. BYARS et B.G. SARNAT) et de troubles thyroïdiens (KONJETZNY, LOWE) a été notée.

Le traitement par l'hyperplasie est souvent insuffisant pour obtenir la guérison. Pour certains, (RUSSETON,

1952] l'extraction, associée à la gingivectomie, empêche toute la récurrence. Ces abcès, qui, d'ailleurs ne sont pas constants après le traitement chirurgical étiologique, sont peut-être dus à l'absence de correction d'un trouble endocrinien tel que l'hyperthyroïdie ou un trouble sanguin associé (4. DECHATEL) tel que anémie, leucémie ou trouble sanguin hématologique.

- Gingivite spécifique de l'enfant. - La gingivite spécifique de l'enfant est une maladie infectieuse spécifique la plus importante. Décrite par DECHATEL et DECHATEL (1941) il survient chez un enfant en période de dentition. La lésion est caractérisée par une gingivite chronique avec des lésions de l'épithélium gingival et de l'épithélium de la muqueuse gingivale par une infiltration de cellules de type lymphocytaire. Les lésions sont caractérisées par une gingivite chronique avec des lésions de l'épithélium gingival et de l'épithélium de la muqueuse gingivale. Le diagnostic est confirmé par l'étude des réactions cutanées (cuti-réaction ou patch-test-réaction) et l'inoculation de l'exsudat au cobaye. Rarement, en effet, on ne peut mettre en évidence, directement ou après culture sur les milieux spéciaux, le bacille de Koch. Le pronostic est bon si les signes de diffusion et de complications sont évités. Or, dans tous les cas, il faut craindre la dissémination biliaire et la méningite. Mais l'évolution est bénigne et la guérison est obtenue si la surveillance et le traitement sont bien conduits. Nous ne saurions trop insister sur la surveillance au cours de la phase initiale et sur l'importance de la température, du poids, du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, du rythme digestif, du rythme urinaire et ponction lombaire au moindre doute.

Le traitement de fond consistera en une cure hygiéno-diététique rigoureuse pendant trois mois s'il s'agit d'une infection simple, et, lorsqu'il y aura des complications, jusqu'à guérison complète de ces dernières. L'alimentation est essentielle, ainsi qu'un régime alimentaire équilibré. Le traitement par les antibiotiques est très discuté, car ceux-ci ne font que ainsi dire aucune action sur le ganglion tuberculeux, et fait que la vascularisation est très diminuée. Cependant, les antibiotiques s'opposent à la dissémination de la maladie. La prophylaxie consistera en la recherche des contagions possibles et en la vaccination anti-tuberculeuse par le BCG.

- Hypertrophie gingivale médicamenteuse à l'indocin. - C'est la commune (KILBAL, FLEMMING, GREGG, HARRISON). Cette hypertrophie atteint 40 à 60 % des sujets traités par cet anti-inflammatoire depuis 6 mois à 1 an. Ce sont surtout les jeunes

sujets qui en sont frappés.

L'hyperplasie siège au niveau des faces linguale, palatine et vestibulaire des dents incisives et prémolaires au voisinage des causes d'irritation. Elle est de moyen volume, forme, labiée, non inflammatoire, non accompagnée par d'altérations alvéolaires, ulcération, hémorragie ou suppuration. La réaction de cette hyperplasie est obscure. L'hyperplasie invoquée par les premiers observateurs ne paraît pas devoir être reconnue. Des observations où le gingivite s'accompagne de signes tels que diabète, dystrophie, diabète, peuvent la rattacher à l'origine centrale de ces troubles.

S'agit-il par ailleurs d'un trouble endocrinien comme tel que l'hypothyroïdisme, ou d'un trouble endocrinien tel que le diabète dans quelques observations ? Dans tous les cas, l'association de la révision de la denture, du brossage rigoureux, l'administration d'un régime alimentaire varié permet d'éviter la récurrence après la gingivite, malgré la continuation de traitement.

- Gingivite et diabète. - La gingivite est fréquente au cours du diabète du jeune.

Sur un groupe de 63 diabétiques jeunes, d'âge variant de 12 à 25 ans, d'une durée de diabète de quelques mois à 10 ans, UBERY et A. CHAPUT (1952) ont relevé 23 cas de gingivite dont 9 chez des enfants de 12 à 15 ans. La gingivite est marginale, localisée, hyperplasique, avec écoulement au brossage de sang. Elle s'accompagne souvent de gingivite, elle peut être associée à une gingivite chronique sans altération de l'articulation alvéolo-dentaire. Elle est rarement nécrotique; elle s'accompagne de parodontite et sous-gingivite; la parodontite est fréquente ainsi que l'odontite du bord libre de la langue et de la face interne de la joue qui garde l'empêchement des dents.

La gingivite évolue par poussées qui s'associent souvent aux fluctuations de l'équilibre du diabète et aux périodes de fatigue. Elle s'accompagne quelquefois de crises de névralgie buccale, des poussées pouvant entraîner l'apparition d'ulcérations douloureuses, bien que rarement.

Dans d'autres cas, c'est à l'occasion d'une période de fatigue, de surmenage ou au moment des règles que ces

L'auteur rapporte, avec M. DUPERRAT, 3 autres cas semblables. Il s'agit d'une kératose palmo-plantaire progressive qui survient chez des enfants issus de mariages consanguins et se transmettant comme un caractère récessif.

Les premiers cas ont été observés en Yougoslavie par STOKICH, BELJAK, LOGAR. Une description initiale ne fait pas mention de parodontose. Depuis la description de MILLER et LAFAYE (1934) une douzaine d'observations font mention de l'association d'une parodontite précoce. TIGRE (1937) donne (1937) J. JODIS et VANHAUS (1941) TIGRE (1942) G. LAFAYE (1942-1947) BOGACHIN (1951) FARMER, GILBERT, ROLES (1953) MILLER et LAFAYE (1953). De tout ces derniers auteurs qui sont revenus sur la description de la maladie, les auteurs précédents n'ayant pas toujours établi un lien entre la kératose palmo-plantaire et la parodontite, les signes de parodontite apparaissent au développement vers 2 ans. L'enfant est édenté vers 3 ans le denture permanente apparaît les dents s'agitent à 12 ans ou 15 ans, l'enfant est édenté total. Il n'y a pas de régression à la vie. Les observations se rapportent à l'hypoplasie anodonta, à des troubles d'association des lésions unguéales et de l'hyperhidrose. La kératose palmo-plantaire progressive atteint la face dorsale du pied et du poignet; ce fait, et la modalité de l'hérédité l'opposent à la kératodermie de TOST UNNA, qui est fixe, dominante et ne s'accompagne jamais de lésion dentaire.

2° Parodontolyse toxique ou réactionnelle. Acrodynie.

Au cours de l'acrodynie, les signes dentaires sont inconstants et nullement proportionnels à l'intensité du syndrome (KIMMELT 1957). Il s'agit d'une parodontose aiguë des dents temporaires avec chute de ces dents sans phénomène inflammatoire survenant de la 2ème à la 10ème semaine de la maladie (RUCK 1955) - TRAUBET 1957). Une seule dent peut être atteinte (RODAN), toutes les dents mandibulaires (RODAN 1955) les dents temporaires des deux maxillaires peuvent être perdues (KIMMELT 1957). On observe parfois la chute des germes permanentes incomplètement calcifiés, des ulcérations à aspect tropéridé de la muqueuse buccale, des ulcérations atones à fond grisâtre, des hémorragies sans lésion épithéliale, sans aspect inflammatoire, mais pouvant se compliquer d'infection occasionnelle, des nécroses étendues des maxillaires, comme dans l'observation KIMMELT 1957. Très souvent, après la chute des dents, on observe une réorption de l'os alvéolaire et parfois, dans

certaines formes très graves, la résorption est considérable, et même, des séquestres peuvent s'éliminer. Ces formes mutilantes sont parfois mortelles (voir notamment LAMONT 1944 p. 32). Mais elles n'ont pas l'effroyable gravité des formes mutilantes atteignant les doigts et les orteils (LAMONT). Le syndrome d'Ossements durs, qui est une complication des troubles vasculaires dominant est d'origine obscure; il peut être déclenché par divers agents, mais on a vu souvent le mercure occuper une place importante (WARKANY, LAPLANE).

Le groupement de troubles importants au niveau des mains, des pieds, des parodontes, déterminé par un désordre vasculaire identique, est connu sous le nom de la "syndrome des extrémités".

Le traitement général est encore incertain et contre les manifestations bucco-dentaires il faut surtout éviter l'infection parcellaire, l'évolution des dents et éviter les déformations (M. DECHAUME 1949).

3° Parodontal et infections spécifiques des parodontes.

L'atteinte des parodontes au cours des infections spécifiques est secondaire.

- La syphilis congénitale à manifestation tardive sous forme d'ostéopériostite diffuse peut siéger au niveau des alvéoles, entraîner la mobilité des dents et leur chute. Cette forme est plus rare que la forme basilaire mandibulaire et elle est impossible à distinguer d'une ostéite diffuse buccale d'origine dentaire, lorsqu'elle survient chez un sujet dont la syphilis congénitale est connue.

- La tuberculose a été incriminée par un certain nombre d'auteurs dans la genèse des parodontoses. MILLER (1947) considère la périostite alvéolaire comme une localisation locale d'une déminéralisation générale du système osseux au cours de la tuberculose généralisée. Cette théorie a été récemment niée par WEILMANN et SIEHER. D'autres auteurs, constatant une fréquence plus grande des parodontoses chez les tuberculeux, l'interprètent comme l'effet d'une diminution de la résistance locale et générale à l'infection.

La tuberculose alvéolaire a été décrite par ZAND (1940) et CHALOPIN (1950). Des signes de périodontite maxillaire avec suppuration et perte des dents sont signalés dans un

L'évolution se traduit par poussées successives de gingivite-stomatite avec exacerbation de tous les signes locaux et fonctionnels. Ces poussées appartiennent à l'état d'un fléchissement de l'état général.

Les signes sont généralisés et prédominent au niveau des groupes dentaires dont l'équilibre osseux-articulaire est défavorable, et ces régions sont la plus souvent les régions incisives et molaires. Cette forme réagit habituellement avec un traitement local, général et à haute hygiène bucco-dentaire, cependant, elles peuvent se transformer en parodontite généralisée et profonde.

- Parodontites profondes. - Elles sont surtout caractérisées par une résorption osseuse plus importante au niveau des régions que la rétraction gingivale, ce qui a pour effet la transformation de sulcus en sacs gingivaux profonds et multiples. Cette forme se traduit aussi uniquement par des signes fonctionnels gingivaux et dentaires marqués.

- Signes fonctionnels. - Les douleurs sont caractérisées soit douleurs vespérales spontanées, vives, irradiées, irradiant soit une pulpite à retro; soit douleurs localisées surtout par la mastication due à l'inflammation du ligament alvéolo-dentaire (périodontite). Dans d'autres cas, on note une sensibilité particulière aux liquides froids ou chauds, à l'air, au brossage, douleurs dues à la décoloration importante des collés et au ciment des dents. Dans d'autres cas, enfin, ce sont des douleurs diffuses peu intenses, provoquées par une poussée de gingivite. Les gingivorragies spontanées ou provoquées sont aussi constantes. Enfin, la mobilité de certains dents ou groupes dentaires peuvent gêner la mastication.

A l'examen on note une gingivite-stomatite caractérisée par la bordure gingivale sortissant les dents à un aspect rougeâtre et est plus ou moins ulcérée, type-herpétique. Les papilles interdentaires sont déformées, elles peuvent être rétractées, décapitées, nécrosées, ce qui donne un boursillement ou aspect irrégulier de la surface gingivale. Le collet des dents est plus ou moins dénudé du côté vestibulaire pour toutes les dents et du côté palatin pour les molaires supérieures. La gencive de certaines dents apparaît et la denture y est toujours abondante.

Les dents sont plus ou moins mobiles du fait de la destruction profonde des éléments de soutien parodontaire.

Nous l'avons observé avec Mme A. CHAIOT 1442 26
sujets dont 17 femmes et 11 hommes.




Observation n° 26

Parodontite généralisée

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60607-7073

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL. 60607-7073



Observation n° 2

racodowite gôlôwîlêde

2 - Parodontite localisée (gumma)

Cette forme est la plus fréquente. Elle se caractérise par la formation d'une poche purulente entre la gencive et la dent, avec une suppuration localisée. Elle est due à une infection bactérienne.

Cette forme est la plus fréquente. Elle se caractérise par la formation d'une poche purulente entre la gencive et la dent, avec une suppuration localisée. Elle est due à une infection bactérienne.



Parodontite localisée

Parodontite localisée



DESCRIPTION OF THE

PERSONALITY OF THE

The subject is a young man, of French origin, born in 1910, and is now residing in the United States. He is a native speaker of French and has a good command of English. He is a single man and is currently unemployed.

1 - PERSONALITY OF THE SUBJECT


The subject is a young man, of French origin, born in 1910, and is now residing in the United States. He is a native speaker of French and has a good command of English. He is a single man and is currently unemployed.

The subject is a young man, of French origin, born in 1910, and is now residing in the United States. He is a native speaker of French and has a good command of English. He is a single man and is currently unemployed.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



1 - Facteurs constitutionnels.

Dans une belle étude, ROUGET affirme que "aucun type constitutionnel n'est exempt de parodontolyse, et que chaque forme de parodontolyse se retrouve dans chaque type. - Le sexe féminin serait plus atteint que le sexe masculin. - La parodontite simple serait l'apanage du caractère lymphatique, la parodontite profonde se retrouverait le plus souvent chez le type bilieux, surtout masculin. - Les parodontolyse où l'influence constitutionnelle est locale et individuelle joue le rôle prépondérant, d'autres où l'influence est locale et générale, où l'influence terminante est locale et générale."

- Le facteur racial semble agir comme un facteur prédisposant. C'est ainsi que l'on a pu noter une susceptibilité particulière aux parodontolyse chez des individus de race juive, les arabes, les berbères, les indiens du Brésil, les nègres, les Indonésiens et les Esquimaux. Pour ce qui est de l'influence du milieu, l'étude nous permet de mettre en évidence l'influence du facteur familial (père, mère ou frère), qui a été noté dans 23 cas.

Certains auteurs ont voulu établir une relation entre le type morphologique et les parodontolyse (KATZ, 1907; HARTMANN, 1911). De même pour d'autres les psychiques seraient les plus prédisposés alors que les athlétiques seraient les moins atteints. D'autres voudraient classer les individus en fonction de l'aspect des cavités buccales ou les engager à classer les individus en fonction de leur aspect physique. Cependant, aucun auteur n'a pu apporter de conclusion définitive dans les relations entre le type constitutionnel ou héréditaire et la forme de parodontolyse.

Cela ne paraît d'ailleurs pas nous surprendre puisque c'est presque impossible de saisir un type pur, car toujours il y a un mélange, il est modifié par le milieu. C'est à l'étude des formes de milieu qu'il faut s'attacher, car le facteur héréditaire pur est encore plein d'inconnues.

C'est ainsi que tous les auteurs sont d'accord sur ce sujet et conviennent que la vie sédentaire, une alimentation trop riche, l'usage de dentifrices, peuvent entraîner une déminéralisation de l'organisme et une moindre résistance au parodontolyse. De même, la classe sociale aurait une incidence sur les parodontolyse et l'appareil buccal. Les individus qui mangent et qui travaillent seraient plus susceptibles que les ouvriers, malgré l'hygiène défectueuse.

- Troubles gastriques : chez 7 malades, ont été trouvés des troubles gastriques, des ptoses gastriques.

Nous pouvons donc constater, comme l'a bien montré VILBERT, l'importance des troubles gastro-intestinaux dans l'étiologie des parodontolyses. Ce sera donc par l'interrogatoire, l'examen général et l'hémoculture gingivale que nous pourrons mettre en évidence l'origine infectieuse de la parodontolyse. Il se produit, en effet, à partir du foyer infectieux primaire, une charge microbienne franchissant le système circulatoire qui aggrave par effet l'émigration dans la gencive et d'y déclencher une parodontolyse.

- Troubles de l'équilibre neuro-vasculaire. - La fréquence de l'association des troubles neuro-vasculaires périphériques et des parodontolyses.

Ces troubles se traduisent chez nos malades par un névrosisme particulier des tendons à l'existence, au début, des troubles circulatoires périphériques, symptômes de l'artériosclérose, le signe de CHOWSTAK, et une déviation des ongles. Nous avons pu retrouver ces signes, isolés ou plus ou moins groupés, dans 42 cas. C'est dire la fréquence et l'importance de ce facteur neuro-vasculaire au cours des parodontolyses.

- Troubles endocriniens. - De très nombreux auteurs ont insisté sur les troubles endocriniens dans l'étiologie des parodontolyses. Nous pourrions citer en particulier ULLMANN, BOCHARD, DELATON, MOSES, VILBERT, MARTIN, BOGNER, LANGE, etc. C'est ainsi que BOCHARD a constaté que des parodontolyses relèvent de troubles hormonaux.

Nous avons pu retrouver dans les antécédents pathologiques des malades atteints de parodontolyses, des troubles génitiaux, hypophysaires, thyroïdiens, parathyroïdiens, surrénaliens.

Le diabète chez le jeune semble aussi jouer un rôle très important (dans le diabète). Cependant, il est difficile de prouver la relation directe entre le trouble endocrinien et la parodontolyse. De même il existe souvent chez le même individu des atteintes associées de plusieurs glandes endocrines, soit vers l'avant ou l'arrière.

CHAPITRE IV

OBSERVATIONS CLINIQUES

Observations de Mme A. CHAPUT, dont une grande partie a été recueillie à la clinique de Stomatologie du Professeur DECHAUME, à l'Hôpital de la Pitié.

Tout d'abord une classification de ces observations en tenant compte du diagnostic que nous avons posé, soit parodontite localisée et généralisée chez l'homme et la femme et parodontose généralisée et localisée.

- PARODONTITE GÉNÉRALISÉE.

a) chez l'homme.

Observation n° 1

Monsieur Gilbert M..., né le 28 Juin 1901, vu à 48 ans le 9 Février 1949, début à 19 ans.

- Facteur racial : Basque.
- ~~anamnèse~~ : ~~traumatisme~~ ~~alcoolisme~~ ~~signes~~ ~~diagnostic~~
alimentation carnée.
- ~~Données~~ : ~~caries~~ ~~stomatites~~ ~~denture~~ ~~malocclusion~~
surcharge incisivo-canine.

- Radiographie : os dense, corticale, nette, résorption alvéolaire horizontale généralisée.

Observation n° 6.

Monsieur Jean-Louis H..., né le 29 Avril 1933 - vu à 20 ans le 10 Février 1953 - début à 19 ans.

- Antécédents : constitution, signes hépatiques, albumine 0, sucre 0.
- Denture : tartre, accidents de la dent de sagesse 48, occlusion normale, mobilité de la région incisivo-canine.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée, limite floue, os poreux.
- Traitement : détartrage, A.C.T.A., extraction 8 et 18 en désincluison. Dilvasène sans résultat - leucopénie 4.000 - amélioration par auto-vaccin (entérocoques), surveillance régulière et détartrage. Régime alimentaire (régime hépatique).
- Pronostic : assez bon.

Observation n° 7.

Monsieur Claude L..., né le 28 Septembre 1924 - vu à la consultation le 15 Octobre 1952 à 28 ans - début à 24 ans.

- Antécédents : abcès amygdaliens à répétition, signes hépatiques, hémorroïdes.
- Denture : tartre, occlusion normale, mobilité des dents, de prémolaires à prémolaires aux deux maxillaires.
- Radiographie : atrophie horizontale généralisée, os poreux.
- Traitement : revu une seule fois pour détartrage.
- Pronostic : médiocre.

Observation n° 8.

Monsieur Michel E..., né le 6 Février 1927 - vu à 22 ans le 30 Avril 1949 - début à 21 ans.

- Antécédents : blennorrhagie, gastrites, alimentation mixte, articulaire à 7 ans.
- Denture : tartre, accidents de dents de sagesse 8 = 18 - traumatisme occlusal.

- Antécédents : broncho-pneumonie à 2 ans, tabac, crispations, crise comitiale en 1947, herpès génital.
- Denture : gingivite à 21 ans; accidents de dent de sagesse g8 - d8.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée.

Observation n° 29.

Monsieur Jean D..., né le 22 Juillet 1922 vu à 28 ans le 27 Février 1950 - début à 23 ans.

- Antécédents : lymphadénopathie à 15 ans, crises de toux par conserves durant la guerre, sueurs, crispations avec contractions douloureuses des masséters.
- Denture : tartre, pus, gingivite à 21 ans - gingivite - née et au brossage - occlusion normale - mobilité de D1 G1 et culs-de-sac et suppuration.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée - résorption verticale sur D1 G1, rhizolyse de D4.

Observation n° 34.

Monsieur Marcel T..., né en 1923, vu à 23 ans le 9 Novembre 1947, début à 20 ans.

- Antécédents : eczéma, troubles digestifs, crises de toux, pâle, sympathicotonique.
- Denture : tartre, pus, gingivite antérieure et gingivorragie, mobilité des dents, supraclusion légère en 2 temps, clapiers purulents.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée.
- Traitement : novocaine, érythroïne sans résultat, puis donnant une légère amélioration.

Observation n° 49.

Monsieur René F..., né le 27 Juin 1932 - vu à 20 ans le 28 Mai 1952 - début 20 ans.

- Antécédents : toux chronique, intoxication par cyanure, cyanose des mains.
- Denture : tartre, abrasion, hypoplasie sur D2 D1 G1 G2 G3 G6; Accident de dent de sagesse sur g8 supraclusion, parodontites oedémateuses, suppuration médiane supérieure et inférieure sans suppuration.

- Radiographie : os max. horizontale cari. - os max. inf. horizontale, généralisée et verticale en D6.
- Pronostic : Bon.

Observation n° 16.

Mademoiselle Claire B..., née le 20 Juin 1905 - vue à 49 ans le 12 Décembre 1951 - début à 25 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : pleurésie gauche, otite double - angéocyanose, appendicite à 17 ans - sigara hépatique - intolérance alimentaire, ménopause, goître colloïde - sciatique, lumbago.
- Denture : tartre, gingivite à 25 ans, grosse stomatite.
- Radiographie : atrophie buccale, généralisée.

Observation n° 17.

Mademoiselle Paulette B..., née le 27 Août 1927 - vue à 25 ans le 28 Octobre 1952 - début à 24 ans.

- Facteur familial : père.
- Antécédents : diphtérie, coïte, anémie, intolérance alimentaire, nervosité, néphrite, insomnie, agitation, crispations, bruxomanie.
- Denture : tartre, malocclusion légère sur les molaires inférieures, parodontite superficielle.
- Radiographie : alvéolite généralisée, légère, à dents jeunes.

Observation n° 22.

Mademoiselle Marguerite G..., née le 11 Mai 1896 - vue à 54 ans le 4 Janvier 1950 - début à 22 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : anémie - anémie 1941 - ménopause 1941 - acrocyanose, sueurs, urticaire.
- Denture : tartre, gingivite, traitement orthodontique pendant 3 ans à l'âge de 10 ans. Edentée molaire infér. droite, mobilité dentaire et culs-de-sac suppurants.
- Radiographie : os max. inf. horizontale irrégulière - atrophie buccale - horizontale floue, atrophie verticale.

- Denture : arrien, abrasion, accident de dent de sagesse et occlusion en bout à bout, surcharge sur G1 et G2.
- Radiographie : résorption horizontale localisée, nette.
- Traitement : extraction de G1 et G2 suivie d'ostéoplastie sans complications inflammatoires observées au niveau de l'extraction; 1 mois plus tard, l'état gingival semble normal.
- Pronostic : bon.

Observation n° 35.

Monsieur Maurice T..., né le 6 Janvier 1923, vu à 29 ans le 25 Avril 1952, début 20 ans (Photos n° 35 et 36).

- Antécédents : scarlatine, scarlatine à 17 ans, anorexie, aérophagie, subitité, alimentation un très court laps de temps après la scarlatine, suivie d'asthénie, acrocyanose, nervosité, spasmes et nausées.
- Denture : suppuration au niveau des dents de 6 ans inférieures, surcharge occlusale en bout à bout au niveau de G6 D6.
- Radiographie de dents, atrophie localisée nette, verticale, médio-périapicale avec hypertrophie du cément de G6 D6 et ostéosclérose.

Observation n° 39.

Monsieur René V..., né le 8 Mars 1916, vu à 32 ans le 16 Octobre 1948, début à 22 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : rien à signaler.
- Denture : arrien, abrasion, supuration et bécasses prémolaires, mobilité des incisives.
- Radiographie : résorption mixte localisée aux incisives.
- Traitement : extraction G4, datartrage, soilage Toulon, acide.
- Pronostic : médiocre.

Observation n° 48.

Monsieur Oscar C..., né le 19 Mai 1925, vu à 27 ans le 5 Novembre 1952, début à 27 ans.

- Facteur racial : Italien.
- Facteur familial.
- Antécédents : gaz, colite, insomnie, anxiété, mentaire, sueurs nocturnes, ongles striés minces.
- Denture : gingivite au croquis l'endosse à la dent sur D6, endognathie supérieure très importante, béances prémolaire bilatérale et incisive, craquement condylien à droite.
- Radiographie : persistance physiologique importante au niveau de D6.
- Traitement : meulage sélectif, vitamine E.

b) chez la femme.

Observation n° 3.

Mademoiselle Monique L..., née le 30 Novembre 1927, vue à 19 ans le 16 Juillet 1946, début à 18 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : scarlatine, angine, crises dépressives, anémique.
- Denture : tartre, caries, lésions apicale sur d6.
- Radiographie : os dense, corticale nette, résorption osseuse coronale généralisée légère et corticale au niveau de D6.
- Traitement : gingivectomie simple, extraction de D6, novocaïne périfaciale (sans effet), dilvosène semble donner une amélioration, extraits placentaires.

Observation n° 18.

Mademoiselle Gilberte C..., née le 1er Décembre 1923, vue à 25 ans le 12 Mai 1931, début à 24 ans.

- Facteur racial : Berry.
- Antécédents : scyphure nouveau vers 17 ans, constipation, digestions longues et difficiles, acrocyanose, frilosité.
- Denture : supraclusion légère, recherche de D6 avec malocclusion.
- Radiographie : atrophie générale horizontale légère.

PARADONTOSE GÉNÉRALISÉE

a) chez l'homme.

Observation n° 12.

Monsieur René C..., né le 20 Janvier 1934, vu à
18 ans en Novembre 1952, début à 18 ans.

- Antécédents : acrocyanose.
- Denture : gingivorragie au brossage et gingivite, nodules gingivaux, hyperplasiques et adhérents. De l'incisive légère supraclusion incisive, surcharge des incisives inférieures et supérieures. Occlusion maxillaire ne sur prémolaire et molaire à droite.
- Radiographie : atrophie horizontale légère généralisée, parodontose superficielle.
- Traitement : extraction de G6, laroscorbine forte.

Observation n° 20.

Monsieur François C..., né le 31 Août 1934, vu à 20 ans le 19 Novembre 1952, début à 18 ans.

- Antécédents : allergie par la bœuf, intolérance alimentaire, végétarien, signe de Chovstek bilatéral.
- Denture : gingivorragie au brossage puis spontanée, gingivite à 20 ans au cours des poussées d'évolution de la malposition sur D4 D3 D2 D1, G1 G2 G3 et d3 d2 d1, g1 g2 g3, surcharge sur G1 d1 g1 g2, endognathie et rétrognathie mandibulaire avec atrésie, béance incisive, canine et prémolaire droite.
- Radiographie : atrophie horizontale localisée nette et verticale en d8, parodontose superficielle généralisée.

Observation n° 30.

Monsieur Pierre D..., né le 19 Août 1925, vu à 27 ans le 20 Juin 1951, début à 17 ans.

- Antécédents : antérieurement et dysenterie à 20 ans, surcharge, agitation.

- Dentures : caries, gingivorragie en brousse et éruption, occlusion normale, parodontites localisées à 65 et 66.
- Radiographie : os dense, atrophie horizontale localisée de verticale en 68 et 66 G6.
- Traitement : détartrage, meulage incisives inférieures, et...

Observation n° 40.

Monsieur Jean-Marie R..., né le 27 Novembre 1927, vu à 25 ans le 25 Janvier 1952, début à 21 ans. (photo 2 - 35)

- Facteur familial : Père.
- Antécédents : oreillons, varicelle, coqueluche, tétanos, méningite, otite érythémateuse, narcoleptie.
- Denture : gingivorragie, ganglion sous maxillaire, sensibilité des pulpes, suraduction au surplomb en bout à bout sur D1 G1, dl g1.
- Radiographie : os dense, cortical net, atrophie horizontale généralisée nette.
- Traitement : hémostase gingivale, streptoantitoxique, auto-vaccin, meulage des incisives centrales.

Observation n° 43.

Monsieur Roger R..., né le 17 Août 1926, vu à 25 ans en 1951, début à 19 ans.

- Antécédents : légères insuffisances hépatiques, ongles striés, tabac.
- Denture : caries, gingivorragie, écoulement gingival, bon gâteau de miel de Thomes, occlusion en bout à bout avec abrasion.
- Radiographie : os dense, atrophie horizontale généralisée.
- Traitement : meulage sélectif, détartrage, extraction dentaire.

Observation n° 45.

Monsieur André P..., né le 19 Août 1925, vu à 26 ans le 17 Février 1951, début à 21 ans.

- Antécédents : tabac, intègre à 10 ans, diarrhées, orchite unilatérale, onichophagie.

- sur D7 G7 d6 d7, parodontose superficielle.
- Pronostic : bon.

Observation n° 52.

Monsieur Guy M..., né le 5 Octobre 1927 vu le 9 Décembre 1952 à 25 ans, début à 24 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : constipation chronique, ictère, intolérance alimentaire, signe de Chovstek, rhumatisme articulaire du genou en 1952.
- Denture : caries, abrasions, lacunes cunéiformes, pas de mobilité dentaire.
- Radiographie : résorption horizontale générale, légère sur d2, parodontose superficielle.
- Pronostic : bon.

b) chez la femme.

Observation n° 9.

Madame F... née le 4 Septembre 1914, vue à 36 ans, début à 26 ans.

- Antécédents : constipation, intolérance alimentaire, acrocyanose, rhumatismes, oedème de Quinck.
- Denture : caries, abrasions, lacunes cunéiformes, pas de mobilité dentaire.
- Radiographie : résorption horizontale et verticale, os dens, limite nette.
- Pronostic : bon.

Observation n° 10.

Madame Rachel M..., née le 2 Janvier 1923, vue le 23 Novembre 1950 à 27 ans, début à 22 ans.

- Facteur racial : Martiniquaise.
- Antécédents : signes gastro-intestinaux, ménorrhagie, nervosisme.
- Denture : caries, abrasions, lésions apicales sur D2.

- édentation molaire partielle, surcharge incisive.
- Radiographie : résorption horizontale et verticale généralisée irrégulière, os poreux.
- Traitement : détartrage, soins de bouche, gingivostomie.
- Pronostic : mauvais.

Observation n° 13.

Mademoiselle Edith C..., née le 11 Décembre 1920, vue à 31 ans le 17 Septembre 1952, début à 20 ans.

- Facteur familial.
- Antécédents : eczéma, régime alimentaire, hyperthyroïdisme, frilosité.
- Denture : terre, sur sur d1 et d2, gingivostomie, gingivostomites antérieures, supraclusion, malpositions dentaires.
- Radiographie : résorption horizontale généralisée, carie locale localisée à G6 d6.

Observation n° 25.

Madame SIMONE M..., née le 31 Mars 1918, vu à 34 ans le 12 Mars 1952, début à 20 ans.

- Antécédents : mastoïdite à 2 ans, intolérance alimentaire, gingivite avant les règles, acrocyanose, troubles nerveux, insomnie nocturne, urticaire.
- Denture : gingivostomie, gingivostomatites antérieures, édentation, surcharge sur d5-g5.
- Radiographie : os dense, corticale nette, atrophie horizontale généralisée peu marquée, atrophie verticale sur D5.
- Traitement : gingivostomie simple sur D5, orlage de dentement.

Observation n° 38.

Mademoiselle Odette T ..., née le 11 Mai 1925, vue à 27 ans le 8 Décembre 1952, début à 23 ans.

- Facteur racial : Normande.
- Antécédents : intolérance alimentaire, aphtes.

- Denture : tartre.
- Radiographie : atrophie généralisée avec resorption des dents de 6 ans.
- Traitement : meulage sélectif.

Observation n° 46.

Mademoiselle Jacqueline P..., née le 29 Mars 1929
vue à 22 ans le 3 Octobre 1951.

- Facteur racial : Est.
- Antécédents : rougeole, scarle du sein, tuberc. appendicé, hernie ombilicale opérée, intoxication alcoolique, règles peu abondantes, cycle irrégulier, arthralgies, rhumatisme, eczéma, rhumatismes, cervicite.
- Denture : gingivorragie spontanée et au brossage, saignement, supuration sans suppuration, bégaiement dans la mastication, blocage antéro-postérieur.
- Traitement : extraction de 45, détartrage, meulage sélectif, solder, détartrage.

A - PARODONTOSE LOCALISEE.

a) chez l'homme.

Observation n° 57.

Monsieur Paul P..., né en 1928, vu en Mars 1953,
début à 24 ans.

- Antécédents : rien à signaler.
- Denture : abrasions.
- Radiographie : parodontose localisée.

b) chez la femme.

Observation n° 56.

Mademoiselle Hugnette R..., née le 13 Novembre 1926,
vue le 2 Février 1953, début à 20 ans.

- Antécédents : atrophie, appendicite chronique, rhumatisme, arthralgies, 2° et 3° degré d'insuffisance rénale, diabète.

CONCLUSION

Nous allons pouvoir tirer de cette revue générale et des observations que nous avons soigneusement rassemblées des conclusions d'ordre nosologique, étiologique, clinique, thérapeutique et prophylactique.

1°) NOSOLOGIE.

Nous avons pu constater que chez le jeune les gingivites et gingivoses d'une part, et les parodontolysees d'autre part, rentrent dans le cadre des maladies générales et peuvent en constituer le tableau clinique. Nous avons noté tout particulièrement que les facteurs de l'équilibre physiologique au niveau des parodontes sont les mêmes qu'au niveau des "extrémités".

2°) ETIOLOGIE.

Quel que soit l'aspect clinique des parodontolysees, l'étiologie est complexe. Il nous semble que l'on peut classer ces facteurs étiologiques en facteurs dominants, secondaires et déterminants.

a) Facteurs dominants :

Le facteur constitutionnel semble créer chez un individu donné un terrain particulier sur lequel pourra se développer une parodontolyse à la faveur d'un trouble général dans la grande majorité des cas, et quelquefois à la faveur d'un trouble local. Ce facteur constitutionnel est déterminé par l'hérédité, le sexe, et la milieu dans lequel vit cet individu.

b) Facteurs secondaires :

Les désordres généraux notés au cours des observations sont variables. Le premier place en importance les troubles

gastro-intestinal, le déséquilibre neuro-vasculaire qui passe sous par les neurosisme particuliers, avec tendance à l'émotivité, aux éruptions, par l'acrocyanose, le signe de Chvostek, une fragilité des ongles, enfin, les troubles endocriniens et plus spécialement l'hypo-thyroïdisme et l'hyper-folliculite.

c) Facteurs déterminants :

Ce sont les facteurs locaux qui déterminent l'aspect et la localisation de la parodontolyse. Ces facteurs chez la jeune avant 25 ans sont dominés par l'évolution de la dent de sagesse et les troubles de l'occlusion, et singulièrement par la suppuradentite; enfin, toutes les causes d'irritation, bursite, caries, morsures, lésions pulpaires, lésions gingivales, caries, sont par voie directe, soit par propagation infectieuse, des inflammations chroniques.

2°) CLINIQUE.

L'étude de 57 observations de parodontolyse ayant débuté avant 25 ans nous a permis d'observer des formes localisées, parodontites généralisées ou localisées, des formes dystrophiques, parodontoses généralisées et localisées. Ces formes, chez ces sujets prédominent sur le haut incisif et les premières molaires.

3°) THERAPEUTIQUE.

La thérapeutique aura pour but essentiel de corriger les troubles généraux et locaux qu'un examen rigoureux et complet aura mis en évidence.

a) Le traitement local est symptomatique. Il consiste à éliminer toutes les causes d'irritation mécanique et infectieuse et à établir prothétiquement ou par action mécanique un véritable équilibre et par suite la fonction. Ce traitement, indissociable d'une hygiène rigoureuse, a pour but d'éviter les complications locales, régionales et à distance.

b) Le traitement général, médical pur, sera une thérapeutique de fond visant à supprimer les ou les désordres pathologiques généraux qui déterminent la parodontolyse.

La prophylaxie, bien souvent négligée nous paraît être un temps essentiel de la thérapeutique. Elle sera :

a) Traitement hygiénique des gingivites, des parodontites, des accidents de dentition, et du développement de la denture.

b) Nous signalerons l'importance du régime alimentaire et du traitement médical des maladies générales qui jouent un si grand rôle dans le développement des parodontolyses.

Travail de la Chaire de Clinique
de stomatologie de la Pitié.

Professeur : DECHAUME.

Vu, Le Doyen :

Léon BINET

Vu, Le Président de thèse :

Michel DECHAUME

Vu et permis d'imprimer
Le Recteur de l'Académie de Paris :

Jean SARRAILH.

B I B L I O G R A P H I E

- ASBELL M.B. and Others - 1939 - Tuberculosis osteomyelitic of the mandible with the tuberculous infection of the oral mucosa. Am J. Orthodont. 25 - 475.
- CHAPUT A., CHAPUT H., FURET - Signes buccaux des lésions aiguës de l'enfant.
- ELIAS J.D. - 1944 - The apparent antagonism between periodontal disease - J. of Periodontology 24 I. 42.
- GUICHARD - 1944 - Endocrinologie et parodontopathe. Archives 1934 - 72 - n° 4.
- ROUCHOT G. - 1952 - Etiologie et traitement des parodontopathies. Thèse 1952.
- FRAUER J.C. - 1943 - Systemic and local factors in periodontal problem - J.A.D.A. 30 - 45.
- BRUCKER M. - 1943 - Journal of dental Research 22 - 309.
- BURKET - 1946 - Oral disease in children - J. New Jersey State - D.Jor. 17-18 - 1946.
- ELIAS J.D., HARRIS H.O. - 1944 - Congenital ectoplasia of the trochosis oral surgery 15 - 964 - 4.
- CASTEL J. - Les manifestations buccales de la maladie de Letterer Siwe - Thèse Paris 1952 - 83 j. Niblis.
- ELIAS J.D., VITTOU - 1950 - Sur les cas de parodontopathe - Minerva Medica - 1-28-981.
- CHAPUT A. - 1951 - Manifestations buccales du diabète juvénile - Revue Odontologique 5 - 285 (voir UHRY).
- CHAPUT A., GUICHARD A., GUICHARD - 1945 - Parodontopathe. Rapport du Congrès de A.R.P.A. à Genève - Juillet 1953.

WIER I.J. - 1951 - Hypercémentose et goût torique - J.E. Dent
Res. 30 - 5 - 754.

LAGARRIGUE J. - 1949 - Contribution à l'étude des parodontites
chroniques - Thèse, Paris.

LAGARRIGUE J. - 1951 - Parodontolyses - Encyclopédie 12 - 1951.

LAPLANE-FABIANT, DESARMENIEN - 1951 - Acrodynie et mercure - Le
nourrisson - 39 - 6 - 235.

LEBOURG L. - 1932 - Un cas d'alvéolyse infantile - Rev. de Stom.
33 - 291.

LEBOURG L & DESCROZAILLES Ch. - 1948 - Alvéolyse infantile Inf.
Dent. 30 - 19.517.

LEERAT A. - 1922 - La tuberculose du maxillaire inférieur - Thèse,
Paris-Arnette - Edit. 99 p.

LEWIS G. - 1943 - Acute necrotizing periodontal disease - J. Dent.
71 - 271.

LEWIS J.C. - 1943 - Dental and periodontal disease in children -
Diagnosis and treatment by Miller - Dickinson

LEWIS J.C. - 1944 - Nutritional deficiencies and dental disease
in Western India - Brit. Dent JI - 76 - 115

MAGILLANBY H - 1952 - Enquêtes sur la santé buccale des enfants de
Newfoundland (Golfe de St-Laurent) en rapport avec une ali-
mentation défectueuse - Arch. of. Dis of Children 27 - 273

MARTINY. - 1943 - Parodontopathies et troubles endocriniens Schmidt
Rundschau. 12 Sept. 1943 - n° 36-37.

MARTIN J. - 1947 - Syndrome parodontaire - J. Dent.
75 - 44.

MILLER J.C., SEIDLER B. - 1940 - Periodontoclasia in the young. New-
York dent JI-10 - 423 - JI. of Dental research 19 549.

NICOLAS G. - 1951 - Un cas rare d'athyroïdisme congénitale - Revue
mensuelle suisse d'odontologie - 61 : 6.603.

ROCHEL. - 1950 - Contribution à l'étude de l'hyperthyroïdisme et
le rôle des troubles ovariens dans la production de l'alvéo-
lyse - Thèse, Paris.

ROCHEL. - 1951 - Contribution à l'étude de l'hyperthyroïdisme et
le rôle des troubles ovariens dans la production de l'alvéo-
lyse - Thèse, Paris.

